

PRECAUZIONI AGGIUNTIVE NELL'ASSISTENZA A PERSONE CON INFEZIONE COVID-19 SOSPETTA O ACCERTATA

In ogni contesto di lavoro e in base all'attività svolta, ogni operatore dovrà utilizzare tipologie di DPI diversi.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare l'intero testo del documento OMS del 27/02/2020 "Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) al link

https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/331215/who-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf

L'OMS è impegnata in un aggiornamento continuo di tali raccomandazioni e via via potranno essere rese disponibili nuove raccomandazioni.

Nell'assistenza a più persone con accertata infezione da COVID-19 (coorte), da un paziente all'altro, gli operatori possono mantenere GLI STESSI DPI (visiera, filtro facciale FFP2/FFP3/mascherina chirurgica, sovra camice) ad esclusione dei guanti, che devono essere rimossi e sostituiti previa igiene mani.

CASO ACCERTATO: paziente sintomatico con positività al tampone.

Le stesse indicazioni valgono anche nell'assistenza a persone con solo sospetto di infezione da COVID-19 (coorte).

CASO SOSPETTO: paziente sintomatico in attesa di tampone.

GUANTI E IGIENE MANI: OBBLIGO DI USO DI GUANTI DURANTE L'ASSISTENZA DIRETTA E IGIENE DELLE MANI DOPO LORO RIMOZIONE. Rispettare i 5 momenti OMS.

In caso di imbrattamento del camice è possibile la sostituzione dello stesso senza obbligatoriamente la rimozione della protezione facciale.

Il filtro facciale può essere indossato in continuità per tutto il turno di lavoro. Deve essere sostituito immediatamente quando risulta danneggiato o visibilmente contaminato.

Il personale sanitario, nonché gli operatori addetti alle pulizie, nel caso di contatti ravvicinati, in particolare modo ad un paziente che manifesta accessi di tosse, sono tenuti a far indossare a quest'ultimo una mascherina chirurgica, laddove tollerata.

LA DIVISA ANDRÀ SOSTITUITA AD OGNI TURNO. A fine turno è preferibile effettuare una doccia.

I DPI riutilizzabili devono essere sanificati con l'utilizzo di ipoclorito di sodio 1.000 ppm (tipo Deornet®).

PROCEDURA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE

VESTIZIONE

- 1) Togliere ogni monile e oggetto personale.
- 2) Igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- 3) Indossare sopra la divisa il camice monouso a maniche lunghe.
- 4) Indossare il filtro facciale/mascherina chirurgica.
- 5) Indossare gli occhiali di protezione o visiera (riutilizzabili).
- 6) Indossare un paio di guanti.

SVESTIZIONE

- 1) Rimuovere occhiali o visiera e deporli nell'apposito contenitore.
- 2) Rimuovere il paio di guanti e igienizzare le mani.
- 3) Rimuovere il camice monouso.
- 4) Rimuovere il filtro facciale/mascherina chirurgica
- 5) Igienizzare le mani.

COME RIMUOVERE I DPI



1. Rimuovere occhiali o visiera



2. Rimuovere il paio di guanti e igienizzare le mani.



3. Rimuovere il camice monouso



4. Rimuovere il filtro facciale/mascherina chirurgica e igienizzare le mani.

Altre indicazioni

A. AMBIENTE

CIRCOSTANTE AL MALATO- dove è presente il malato-fonte.

OPERATORE CON DPI (vestizione-svestizione)

SANITARIO COMUNE A TUTTI gli operatori.

OPERATORI senza DPI.

B. DURATA DELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

E' imperativo che accedano all'assistenza-clinica-terapia-diagnostica di un malato sospetto o accertato unicamente operatori **strettamente necessari** al fine di limitare l'esposizione a Covid-19 e per contingentare l'utilizzo di DPI.

C. TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Si definiscono attività che generano aerosol

MANOVRE INVASIVE-RESPIRATORIE quali: intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheotomia, rianimazione cardio-vascolare e ventilazione manuale, broncoscopia. In questo caso è tassativo l'utilizzo di Filtri facciali FFP2-FFP3.

Durante le MANOVRE STERILI i camici e i guanti devono essere sterili.

D. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti devono essere smaltiti nei contenitori a rischio infettivo e secondo indicazioni aziendali standard.

La biancheria del letto deve essere raccolta in doppio sacco per evitare la rottura durante il trasporto.

Alla dimissione del malato inviare al lavaggio tutti gli effetti lettereci . I materassi vanno sostituiti se macroscopicamente contaminati.

E. PULIZIA DELL'AMBIENTE

Il personale addetto alle pulizie deve indossare i DPI necessari.

Sono indicati panni monouso e detergente disinfettante standard.

Le stanze di degenza devono essere sanificate al termine del percorso di pulizia giornaliero e con frequenza standard

Alla dimissione del malato far procedere con detersione/disinfezione delle superfici verticali e orizzontali secondo procedura aziendale.

F. DISPOSITIVI E PRESIDII DI ASSISTENZA

Utilizzare dove possibile presidi monouso. Diversamente dedicare al singolo malato i presidi necessari all'assistenza (termometro, bracciale pressorio, fonendo...) e altro materiale in minime quantità.

I presidi o apparecchiature pluriuso, devono essere sanificati con l'utilizzo di ipoclorito di sodio 1.000 ppm (tipo Deornet©) prima dell'utilizzo per altri malati.

Inviare a riprocessazione i dispositivi pluriuso secondo indicazioni standard.

G. GESTIONE DELLE STOVIGLIE

Segnalare presenza di malati con sospetta o accertata COVID per stoviglie monouso. I residui alimentari e le relative stoviglie dei malati devono essere eliminati nei contenitori a rischio infettivo presenti all'interno della camera di degenza. Eliminare in cucina gli alimenti non consegnati al malato prima del rinvio del carrello.

Per altre indicazioni non riportate in questo documento attenersi alle indicazioni aziendali per malattie a trasmissione per contatto e droplet.