
6 MARZO 2020

TRATTAMENTO DEL DIABETE E DELL'IPERGLICEMIA NEI PAZIENTI COVID-19

1. SE PAZIENTI GIA' DIABETICI IN TERAPIA CON METFORMINA, SOSPENDERE IL FARMACO. **LA METFORMINA IN CONDIZIONI DI IPOSSIEMIA AUMENTA ENORMEMENTE IL RISCHIO DI ACIDOSI LATTICA.**
2. ALTRI FARMACI ORALI POSSONO ESSERE MANTENUTI.
3. IN CASO DI GLICEMIE A DIGIUNO > 180 MG/DL, INIZIARE CON LA SEGUENTE STRATEGIA DI BASALIZZAZIONE:
 1. 10 U DI GLARGINE (LANTUS O ABASAGLAR) DOPO CENA
 2. BASTA MISURARE LA GLICEMIA AL MATTINO E PRIMA DI CENA
 3. SE LA GLICEMIA AL MATTINO SUPERA I 150 MG/DL, AUMENTARE DI 2 U LA DOSE DI LANTUS LA SERA SUCCESSIVA E COSI' VIA. LA DOSE DI LENTA VA AUMENTATA OGNI GIORNO DI 2 UNITA' SE LA GLICEMIA AL MATTINO SUPERA I 150
 4. SE DURANTE LA GIORNATA SI RISCOVTRANO VALORI DI GLICEMIA > 200-250 MG/DL, SOMMINISTRARE 5 U DI LISPRO (HUMALOG)